

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

DLP - 1 - 9 - BULLETIN 99
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

60,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 162 du 19 AOÛT 1980.-

ARBRES FRUITIERS

MINEUSES DES FEUILLES.- (Stigmella malella)

Le traitement conseillé dans le bulletin n° 158 du 25 Juillet va devenir insuffisant. Il y a lieu d'intervenir avant le 22 Août.

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE.-

- Mildiou

De nouvelles contaminations ont pu se produire lors des dernières pluies. La protection devra être assurée tout particulièrement en cultures d'altitude.

En cas d'attaque de mildiou, ne pas attendre qu'il y ait plus de 10 % du feuillage détruit pour procéder au défanage avec l'un des produits suivants : chlorate de soude, dinosèbe, diquat, D N O C huileux.

C O L Z A.-

- Traitement des semences

1°) MALADIES

Afin d'éviter des attaques sur jeunes plantules (fonte des semis), il y a lieu de désinfecter les graines de colza, ou de se procurer des semences traitées.

Les matières actives pouvant être utilisées sont les suivantes :

- Captane : 2,4 g de matière active par kg de semence (efficace sur ALTERNARIA)
- Oxyquinoléate de cuivre : 375 mg de matière active par kg de semence (efficace sur PHOMA et ALTERNARIA)
- Mercure (Silicate de méthoxyethymercure) : 37,5 mg de matière active par kg de semence (efficace sur ALTERNARIA)
- Thirame : 2,4 g de matière active par kg de semence (efficace sur PHOMA et ALTERNARIA).

2°) RAVAGEURS

- Altises : Contre ces ravageurs, le traitement des semences est recommandé. Utiliser de préférence le méthiocarbe (MESUROL à 50 g de produit commercial par kg de semence).

Le CARBOFURAN peut être utilisé au semis, en traitement localisé à la dose de 600 g de matière active par ha (dose homologuée).

(D'après les essais du C.E.T.I.O.M., une dose de 450 g de matière active par ha pour un écartement de 34 cm donnerait des résultats analogues).

Cet insecticide assure la protection durant toute la période automnale (implique l'utilisation d'un microgranulateur).

J. THIAULT

DIRECTEUR-GÉRANT :

P. 170

DESHERBAGE DU COLZA (Tableau réalisé avec la collaboration du C.E.T.I.O.M.)

1°) PRE-SEMIS (avec incorporation)

Matière active	Noms commerciaux	Dose de m.a. en g/ha	Utilisation
napropamide	DEVRIOL	1000 à 1250	Moyen sur graminées (insuffisant sur folle avoine) - bonne action sur dicotylédones (moyen sur capselle, fumeterre et pensée ; faible sur ravenelle).
nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	800 + 700	Bonne action sur ray-grass - Insuffisant sur folle avoine - Bonne action sur dicotylédones -(faible sur capselle fumeterre, pensée et ravenelle.)
trifluraline	TREFLAN	1200	Bonne action sur paturin, ray-grass, vulpin (insuffisant sur folle avoine et repousses de céréales) - efficace sur dicotylédones : coquelicot, gaillet, véronique, stellaire.
butam	COMODOR	2880	Bon sur matricaire et coquelicot - Bon sur ray-grass, moyen sur folle avoine, irrégulier sur repousses de céréales. A incorporer sur sol caillouteux et motteux. Peut s'appliquer sans incorporation entre semis et levée dans les autres cas.

2°) POST-SEMIS

PRE-LEVÉE

dimétachlore	TERIDOX	1250 à 1500	Actif sur paturin, ray-grass, vulpin. Insuffisant sur folle avoine et repousses de céréales. Efficace sur matricaire et capselle. Ne pas utiliser en terre légère et filtrante (risque de phytotoxicité).
--------------	---------	----------------	---

3°) POST-LEVÉE

dalapon	ALATEX, DOWPON, DALAPHYT, SPICA 10	2125 après le stade 2 F du colza	Actif sur paturin, ray-grass, vulpin, repousses des céréales - appliqué tardivement sensibilise le colza au froid.
carbétamide	LEGURAME P M	2100 à partir du stade 4 F du colza	Action sur paturin, ray-grass, vulpin et repousses de céréales. Irrégulier sur folle avoine, insuffisant sur dicotylédones. Traitement possible sur sol gelé.

propyzamide	KERB 50 W	500 à 750 à partir du stade 3 F	Action sur paturin, ray-grass, vulpin et repousses de céréales (irrégulier sur folle avoine) - Insuffisant sur dicotylédones.
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	500 + 160 à partir du stade 4 F (impératif)	Bonne action sur graminées et repous- ses de céréales (irrégulier sur folle avoine). Moyen sur sanve, ravenelle, véronique, stellaire.
Alloxidime-sodium	FERVIN	750 g matière active ou 750 g de produit commer- cial + 3 l d'huile post- levée des ad- ventices 3 F à mi-montaison des graminées	Bonne action sur ray-grass, vulpin, folle avoine et repousses de céréales. Inefficace sur paturin. Traiter le soir par condition humide.
benzoylprop-éthyl	SUFFIX 20 FACTEN 20	1000 début montai- son du colza	Anti-folle avoine spécifique.

Autres produits homologués : en pré-semis diallate (AVADEX), nitralin (PLANAVIN W 50) et TCA (nombreuses spécialités) utilisables en pré-levée et en post-levée.

P/ Le Chef de la Circonscription
L'Ingénieur d'Agronomie,

Ph. MUSARD.